n°. 189.

observation sur une tumeur De la parrotide, Prise pour une Loupe ; qui á Eté Emportée avec succés, par M. Faijoux ancien premier eleve De L'hôpital St. andré De Bordeaux Pour L'interieur, actuellement chirurgien á angoulême.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le 20 avril 1766, j'ai Eté consulté Pour une tumeur á La Joue, que portoit M. Berthoumé De La vüe, agé De 45 ans homme De distinction Residens á Montbreon Petite ville á 4 Lieux D'angoulême ; j'examinai d'abord La situation De La tumeur, qui Etoit Depuis L'arcade Zigomatique Jusqu'au Dessous de L'angle, De La machoire inferieure d'une part ; et de L'autre, depuis le conduit auditif externe qu'elle Bouchoit En partie par compression, jusqu'au Dela du muscle masseter : alors je saisis La tumeur, que je trouvai assés mobile, d'où je conclus, que c'etoit une tumeur Enkistée du genre des Loupes, qu'un tissu cellulaire [illegible] separoit De la parrotide, et lui Permetoit La mobilité que j'y avois remarquée ; En consequence J'en proposai L'extirpation avec L'instrument tranchant ; M. vallié medecin, et Beaufrere Du malade et M. Siriés chirurgien, tous Les deux, jouissant De la

ARC 53 n° 20

plus grande reputation dans notre Province (et assurement bien meritée) furent du même avis que moi ; le malade resolu et Preparé à l'operation, j'y Procedai Le 9 mai.

aprés avoir mis la tumeur à nud, et avoir exactement gompé le sang, je voulus separer Le Kiste de la parrotide, mais je fus bien surpris en voyant que la tumeur etoit une production De Cette glande même ; car sa structure exterieure n'etoit Point changée à son volume prés, et à La grosseur des grains glanduleux qui la composent ; enfin en poursuivant ma dissection du Côté de La commissure des levres, je vis trés distinctement Le Canal de stenon, bien plus gros qu'il ne l'est ordinairement ; ce qui me donna une pleine connoissance Du caractere De la tumeur, mais j'avois tout à craindre du succés De L'entreprise, que je trouvai fort Difficile à cause des accidents inseparables s'il semble de la section d'une glande aussi composée que La parrotide ; et essentiellement une fistule salivaire paroissoit en devoir etre La suite ; cependant je crus trouver assés de ressource dans la Bonne chirurgie pour obtenir une heureuse reussite ; consequament je me determinai à emporter De la parrotide ce qui etoit sorti De la sphere naturelle, c'est à dire ce qui faisoit La tumeur, par une section verticale aijant soin d'eviter le canal D'estenon : ma section faite j'eus un Ecoulement salivaire Des plus considerables, ainsi que Je l'avois annoncé ; je mis sur La surface coupée De la parrotide des bordonnets mollets trempés dans un melange D'eau vulneraire, et d'eau commune afin de resserrer les vaisseaux excreteurs de Cette glande qui avoit necessairement eté coupés ; le reste De la plaie fut tamponné

5/

Louverture Des cadavres á qui on disoit Lavoir emportée Lont demontré.

3.° que dans une tumeur enkistée, quand on en fait lexamen et qu'on y remarque dela mobilité, il faut faire une attention tres exacte, si cette mobilité depend du roullement Dela tumeur entre les parties environentes, au moyen de quelque tissu cellulaire qui l'y attache, ou bien si cela depend de la laxité des parties adjacentes, ou de la tumeur même; comme dans celle qui fait Le sujet De cette observation et qui etoit ocasionné par les attouchemens frequens, depuis six ans que M. dela vue portoit cette tumeur: on lui avoit dit qu'a force dela toucher souvent rudement il la fairoit dissiper.

4.° que dans une tumeur De cette nature, Loperation de Celle ci faite avec succés, peut enhardir Le chirurgien; cést aussi ce qui me portera á en entreprendre une autre de cette espece, Pour laqu'elle un avocat respectable m'a consulté; et certainement si jeusse connu que la premiere fut une production De la parrotide, je me serai bien donné de garde d'y ~~[illegible]~~ toucher; par lincertitude où lon est en parcourant les auteurs de Chirurgie sur de pareils procedés.

BIBLIOTHEQUE ... MEDECINE

trés mollement avec dela charpie brute ; j'interdis au malade tout alliment solide et tout mouvement Dela machoire et je le saignai trés copieusement ; mais malgré ses precautions, tout L'appareil fut bientôt innondé De salive, qui même couloit le long dela poitrine en abondance . cest ecoulement s'est soutenu au même degré jusqu'au 9.e jour qu'il commença á diminuer ; je substituai á L'eau vulneraire dont je metois Dabord servi pour mettre sur la parrotide, la sarcocole pulverisée et la colofane ; L'ecoulement se tarit De jour en jour depuis le 9.e de sorte que le 13.e il ne sortoit plus de salive par la plaie : il est vrai qu'il en suintoit toujours quelque peu qui venant á se meler, avec le pus le rendoit plus où moins sereux, de sorte qu'il n'a jamais eû les qualités requises d'un pus louable ; cependant j'ai conduit cette plaie á une bonne cicatrice qui á ete formée au bout de cinq semaines, et si peu difforme qu'on ne diroit point que M. dela vûe ait eû cette tumeur n'y subi L'operation.

Il ne faut pas obmettre que pendant* qu'a duré le traitement, le malade á observé une diette Des plus severes ; La structure anatomique Dela parrotide, et la phisiologie font sentir combien il etoit essentiel d'eviter la mastication ; car encore aujourd'huy que la cicatrice est trés solide et qu'il y á prés d'un an qu'elle est formée, la salive sort á travers en maniere de rosée, Lors dela mastication, ce que j'ai souvent observé en voijant prendre Les repas á M. dela vûe . enfin je n'entre pas dans un plus grand detail, des differens moijens qui ont eté mis en usage, n'y dela maniere de les employer, qui ont eté variés suivant les circonstances, crainte

*tout le temps

D'etre trop minutieux aux yeux D'une academie, et qui D'ailleurs se rapportent aux principes De nôtre art, et aux Regles etablies.

De L'exposé qu'on vient de faire on peut conclure 1.° que Cette observation n'auroit rien de particulier, s'il etoit aussi facile D'extirper La parrotide en entier comme le donne à Entendre hister, dans sa methode d'executer Cette operation ; mais celui qui aura la structure anatomique de la partie bien presente ne l'entreprendra jamais : et je suis surpris qu'un anatomiste tel que hister l'ait proposé ; car quel est le chirurgien assés temeraire, pour aller fouiller entre les apophises stiloide et mastoide, pour y aller chercher une portion De cette glande qui y est nichée ? ne s'exposeroit-til-pas aux dangers les plus evidents ? puisque la section du tronc de la carrotide externe, et celle du tronc de la portion dure de la 7.e paire de nerf à sa sortie Du crâne, paroit presque inevitable ; la phisiologie et la patthologie font sentir Les consequences de ces accidents ; je remarquerai seulement en passant qu'on n'auroit pas la ressource Du point d'apui pour arreter L'hemoragie, comme quand l'artere est parvenüe sur la branche De la machoire inferieure, où à la Region temporale ; la ligature seroit donc le moyen le plus sur, mais elle me paroit fort diffiulle à faire dans lendroit supposé. quand à la section du tronc de la portion dure De la 7.e paire, nous savons par experience, qu'il en resulteroit une paralisie de presque tous les muscles de la face du coté où on l'auroit faite &c.

2.° que quelques auteurs qui croyent avoir emporté La parrotide en entier ne l'ont fait qu'en partialité : comme dans le fait que je rapporte, et comme